

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

AUVERGNE ET LIMOUSIN

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative, rue Pélissier
63034 Clermont Ferrand Cedex
(73) 92-42-68



BULLETIN TECHNIQUE
PUBLICATION PERIODIQUE

Edition générale

Le 5 Septembre 1983

N°26

VIGNE

POURRITURE GRISE

. Situation actuelle

La plupart des vignes sont contaminées.

L'installation de la maladie s'est produite suite aux attaques de vers de la grappe et à l'éclatement des grains provoqué par les pluies importantes après la période de sécheresse.

Les conditions climatiques actuelles sont très favorables au développement de ce champignon.

. Préconisations

Le renouvellement du traitement est à effectuer avant le 10 Septembre.

Utiliser un produit à base d'imides cycliques : procymidone (SUMISCLEX - 1,5 kg/ha), vinchlozoline (RONILAN - 1,5 kg/ha) ou iprodione (ROVRAL - 1,5 kg/ha, KIDAN - 3 l/ha).

Pour obtenir un maximum d'efficacité : réaliser une pulvérisation dirigée sur les grappes ; respecter les doses d'emploi, ainsi que le délai d'emploi (arrêter tout traitement 3 semaines avant la récolte).

ARBRES FRUITIERS

MALADIES DE CONSERVATION

Les conditions climatiques actuelles sont favorables aux contaminations des fruits.

. Traitements de pré-récolte

Réaliser les traitements conseillés dans un précédent bulletin.

P.275

DIRECTEUR-GERANT : B. MORIN

N° de série : 330

Numéro d'inscription à la C.P.A.P. : 525 A D

Régie de Recettes de la D.D.A. C.C.P. Clermont-Ferrand 5 503.17

ABONNEMENT ANNUEL : 100 F

Compte-tenu du risque tavelure et la possibilité d'attaque de maladies, autres que les gloeosporioses, préférer l'emploi d'un produit mixte.

. A la récolte

- Eviter les souillures de terre des fruits, et caisses ou pallox.
- Ne pas laisser séjourner les fruits cueillis dans le verger.

BETTERAVES

MALADIES

La période très humide que nous avons connue a été favorable au développement de la Cercosporiose.

Maintenir une surveillance des parcelles dont l'arrachage est prévu après le 15/10 et intervenir dès l'observation de petits foyers.

Choisir un produit actif sur cercosporiose et oïdium.

COLZA

GROSSES ALTISES

- Lutte curative raisonnée

Surveiller vos cultures dès la levée.

Le piégeage à l'aide de cuvettes jaunes est recommandé pour apprécier l'arrivée et l'activité des adultes.

Un réseau de piégeage est mis en place dans toutes les zones à colza de la circonscription.

Des indications seront fournies régulièrement (arrivée des insectes, intensité, seuil d'intervention, produits...).